

## ESQUEMA DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS DE 0 A 13 AÑOS

RECÉN NACIDO HASTA 5 AÑOS	RECOMENDACIÓN Y/O ESQUEMA	DOSIS
Hexavalente (DTP + Hib + Polio + HB)	A los 2,4,6 meses.	3 dosis
Pentavalente (DTP + Hib + IVP)	A los 2,4 y 6 meses. Refuerzo a los 18 meses.	4 dosis
Hepatitis B	Al nacer dosis adicional 2, 4 y 6 meses.	3 dosis+
Rotavirus	A partir de 2 meses, con intervalo de 2 meses hasta los 8 meses. Según la marca de la vacuna y la recomendación médica.	2 ó 3 dosis
Neumococo 13 – Valente	A los 2,4,6 meses. Refuerzo entre los 12 y 15 meses. > de 1 año (2 dosis con intervalo de 2 meses) >2 años (1 dosis)	3 dosis + refuerzo
Neumococo Decavalente	A los 2,4,6 meses. Refuerzo entre los 12 y 15 meses. >1 año consultar esquema con el médico.	3 dosis + refuerzo
Neumococo 23 Valencias	A partir de los 2 años. Refuerzo según recomendación médica, (niños con patología de riesgo).	1 dosis + refuerzo <small>según recomendación médica</small>
Sarampión, Rubéola y Paperas (SRP)	Al año. Refuerzo cada 10 años.	1 dosis + refuerzo
Varicela	A partir de 1 año. Refuerzo a los 5 años > 1 año - < 13 años dosis 0 y refuerzo a los 3 meses.	1 dosis + refuerzo
Sarampión, Rubéola y Paperas (SRP) + Varicela	A partir de los 12 meses hasta los 12 años y refuerzo a los 5 años.	1 dosis + refuerzo
Fiebre amarilla	Al año. Refuerzo cada 10 años hasta los 59 años.	1 dosis + refuerzo
Hepatitis A	A partir de 1 año dosis 0 y 6 meses después de la primera dosis.	2 dosis
Meningococo BC	A partir de los 3 meses de edad. 2 dosis con intervalos de 2 meses.	2 dosis
Meningococo Conjugada de polisacáridos bacterianos de meningococo grupos A, C, T, W135	Menactra a partir de 9 a 23 meses. Dos dosis 0,5 ml con intervalo de al menos 3 meses. Entre 2 y 55 años, una (1) sola dosis.	2 dosis > 9 meses 1 dosis > 2 años
	Menveo a partir de 2 meses. 3 dosis de 0,5 ml con intervalos de 2 meses. Y una cuarta dosis entre los 12 y 16 meses. Entre los 2 y 55 años, una (1) sola dosis.	4 dosis > 2 meses 1 dosis > 2 años
DPT + Polio	Entre 4 y 6 años.	1 dosis de refuerzo
Influenza Pediátrica 0.25 ml	A partir de 6 meses dosis 0 y 1 mes después de la primera dosis (niños de 6 a 35 meses).	2 dosis
Influenza Adultos 0.5 ml	A partir de 3 años dosis 0 y 1 mes después de la primera dosis (niños de 3 a 8 años).	2 dosis

## ESQUEMA DE VACUNACIÓN PERSONAS A RIESGO Y CON CONDICIONES ESPECIALES

VIH (SIDA)	RECOMENDACIÓN Y/O ESQUEMA	DOSIS
Hepatitis B	0, 1 Y 6 meses.	3 dosis
Neumococo	> De 2 años. Una (1) dosis de refuerzo a los 5 años. > de 65 años sin refuerzo.	1 dosis + refuerzo
Influenza	Anualmente, cepa actualizada.	1 dosis
VIAJEROS	RECOMENDACIÓN Y/O ESQUEMA	DOSIS
Fiebre amarilla	> 1 año viajeros a zonas de endemia, migrantes y personas de la salud.	1 dosis
Fiebre tifoidea	> 3 años, una (1) dosis y refuerzo cada 3 años.	1 dosis + refuerzo
Meningococo BC	> 3 meses, primera dosis y 2 meses después. Viajeros en zonas de riesgo.	2 dosis
Meningococo conjugada de polisacáridos bacterianos de meningococo grupos A, C, Y, W135	Entre 2 y 55 años, una (1) sola dosis.	1 dosis
Influenza	Anualmente cepa actualizada.	1 dosis